

50067/P  
75.527  
Q. D. O. M. B. V.

---

DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA

---

DE

# COLICA

---

QVAM

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO

SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO

D O M I N O

GVILIELMO HENRICO

DVCE SAXONIAE IVLIACI CLIVIAE MONTIVM AN-  
GARIAE ET WESTPHALIAE COMITE SAYNAE  
ET WITTGENSTEINII RELIQUA

---

AVCTORITATE ET CONSENSV GRATIOSISSIMAE FAC. MEDICAE

P R A E S I D E

IOANNE ADOLPHO WEDELIO

PHILOS. ET MED. D. PRAXEOS ET CHIMIAE PROF. PVBL. ORD.  
SERENISS. SAX. DVCVM CONSIL. AVLICO ET ARCHIATRO  
ET ACAD. NATVR. CVRIOS. COLLEGA

PATRONO ET PRAECEPTORE SVMMA PIETATE COLENDO

P R O L I C E N T I A

SVMMOS IN MEDICINA HONORES RITE OBTINENDI

PVBICO ERVDITORVM EXAMINI SVBIECIT

A V C T O R

TOBIAS GOTHOFREDVS STRELIN

OETTINGENSIS

---

AD D. XXVI. SEPT. ANNO M DCC XXXIX.

---

IBNAE LITTERIS IO. FRIDERICI RITTERI.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

A 311 1000

ON THE HISTORY OF THE  
INDIAN PEOPLE

OF THE GREAT PLAINS  
AND THE MOUNTAIN STATES


BY  
J. W. FULTON

CHICAGO  
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS  
CHICAGO, ILL.





I. N. I.

§. I.



COLICA est dolor intestinorum, præcipue coli, vehemens, a fibrarum neruearum tum eorundem, tum mesentericarum, tensione spasmodica proueniens. Dolorem esse colicam, sensus ægrorum satis testantur, de hoc enim conqueruntur anxie, & liberari ab eodem desiderant. Vehemens dolor est, leuis enim ac statim iterum cedens colicæ nomine non venit. Intestinorum dolor est, cum aliæ quoque partes in cauitate abdominis hærentes dolore quidem adficiantur, qui tamen minime colica appellari solet, adeoque intestinorum tristis sensatio ita tantum nominatur. Præcipue coli intestini dolor ita audit, a quo etiam nomen hoc accepisse videtur, vt in ieiuno & ileo si hæreat, iliacus dolor inprimis dicitur. Haud raro tamen vterque dolor colicæ nomen gerit.

§. II.

Principale colicæ subiectum constituunt fibræ intestinorum nerueæ, quia ab his sensus & motus eorundem dependet; siue per se immediate adficiantur, siue, fibris



nerueis mesenterii vitiatis, in consensum trahantur, vnde hæ quoque aliquando causæ subiectum constituunt. Has nonnulli quidem pro subiecto colicæ principali habent, minime tamen id esse queunt, cum sæpissime colica fiat, his plane infontibus deprehensis; illæ autem semper labem sustinent. Perinde vero est, siue in interna superficie, siue in substantia media, siue in externa superficie, intestini sitæ fibræ nerueæ primitus adficientur. Colon præcipue, hinc & aliquando reliqua intestina, ob has tali dolore corripuntur. Mirum autem non est, si ventriculo, partibus nerueis vicinis aliis, & musculosis, vitium diuersimode communicetur.

### §. III.

Immediata colicæ causa est tensio dictarum fibrarum neruearum spasmodica. Duplicis autem generis fibræ nerueæ in intestinis reperiuntur, aliæ, quæ sensum præstant, aliæ vero, quæ motui fibrarum intestinorum carnearum inferuiunt. Si illæ, quæ sensum præstant intestinis, tensionem præternaturalem vehementem subeant, immediate oritur dolor, vt ex generali dolorum doctrina patet; si autem mouentes fibrillæ nerueæ, spiritus ex fibris carneis reuehentes, præter naturam tendantur, fit irritatio, maior & præternaturalis spirituum ad fibras carneas adfluxus, & harum contractio præternaturalis, seu spasmus, isque dolorosus. Fibrillas autem nerueas, spiritus reuehentes, in spasmu quocunque ita adfectas esse, ex *dissertat. D. D. Præsidis de Conuulsione* constare potest. Sæpius vtraque tensio fibrillarum, & sentientium & mouentium, ab obiecto tendente infertur, haud raro autem mouentes tantum ita ab alio tendente adfliguntur, adeoque semper tensio  
spasmo-



spasmodica in colica adest. Cum per mesenterium transeant fibræ nerueæ, spiritus reuehentes, idem effectus confurgit, si in hoc obiectum distendens hæreat, & has fibrillas adficiat, nam pari modo refluxus spirituum impeditur, & adfluxus ad fibras musculosas intestinorum redditur maior & præternaturalis, adeoque contractio harum spasmodica & dolorosa efficitur. Ergo & hæc tensio est spasmodica.

#### §. IV.

Tensio hæc fibrarum neruearum spasmodica fieri haud potest, nisi obiectum tendens adsit, cum fibræ hæ se ipsas tendere nequeant. Tale obiectum euadunt in primis flatus & humores vitiiati, aliquando & aliæ res, præter naturam in intestinis & mesenterio hærentes. Sæpius in culpa sunt intestinorum flatus, si & nimis copiosi, & acres, euadant, & exitum debitum habere nequeant. Abundantes si sint, & copiosiores nascantur, nec pergere valeant, in intestino inclusi, hoc distendendo tensionem fibrarum neruearum recensitam præstant. Acrimonia si vna gaudeant, acida, acido biliosa, vel alia, fibris nerueis se insinuant particulæ acres, & morficando, pungendo, rodendo, easdem tendunt. Inprimis autem coniunctus est exitus denegatus, hic enim liber si esset, haud possent in tantum accumulari, vt distensionem facerent, quin potius propellerentur & minuerentur.

#### §. V.

Sæpe autem ipsi flatus sui exitum impediunt, si subito augeantur, & prius, quam exitum habere possunt, intestinum vehementius in vno loco distendant. Tunc enim in loco vicino contractionem spasmodicam fibrarum carnearum excitant, & sic angustia inferitur;



fique acrimoniam coniunctam habeant, per hanc etiam similis contractio & angustia inducitur. Reliquæ etiam causæ, vt humores vitiati viscidum adhærescentes, vel acrimonia sua contractionem spasmodicam efficientes; scybala nimis accumulata, exsiccata, acriora & viscida existentia, &c. flatibus si coniunctæ sint, eorum exitum impediunt.

### §. VI.

Oriuntur autem flatus præternaturales ab humoribus viscidis, crassis, lentis, tenacibus, scilicet fermentatiua in se continentibus; vnde scilicet hæc, sui iuris reddita, in se inuicem & partes sulphureas tenaces agunt, fermentationem sic præstant, & in vapores, seu flatus, resolunt humores dictos, vnde non inepte humores eiusmodi minera flatuum dici solent. Flatus autem hi ratione qualitatis varietatem quoque habent, & sine acrimonia sunt, si in minera eorum scilicet vel non copiosiora eminent, quam ad fermentationem sunt necessaria; vel fixiora hæc sint, vt minus simul exhalent & flatibus mixta sint. Aciores autem redduntur flatus, si copiosiora, & exhalabilia, scilicet in minera vna contineantur, quæ, pro diuersa sua conditione, diuersam etiam acrimoniam flatibus communicant.

### §. VII.

Sine acrimonia si sint flatus, nec in minera eorundem plus scilicet hæreat, quam vt fermentationem flatulentam excitent, minera, seu humor hic, in se obiectum tendens non simul constituit, sed flatus ex hoc orti tantum eam tensionem faciunt; si autem magis scilicet in minera emineant, vel exhalabilia, vel fixiora, non tantum flatus, verum etiam ipsa minera flatulenta, mor-

ficando,



ficando, rodendo, pungendo, &c. tensionem spasmodicam vna efficiunt. Excitatur talis fermentatio flatulenta vel sponte, si salia fermentatiua in tantum exuperent, vt agere sufficienter possint; vel si ab accedentibus adsumtis aut augeantur, aut tam per hæc, quam per alias causas, in motum citentur.

### §. VIII.

Præter flatus & mineram flatulentam, humores etiam seorsim obiectum tendens euadunt, licet non in flatus resoluantur, si peccent acrimonia & viscositate. Acrimonia rodendo, pungendo, lancinando, &c. fibras nerueas, tam alias dolorem, quam spasmum dolorosum, intestinis adfert; viscositas autem efficit, vt & salia copiosiora in minori spatio coniungantur, & ita concentrata, magisque actiua, reddantur, & humor hic acris aut intestinorum superficiei vel internæ, vel externæ, adhærescat, diutiusque persistat, aut in vasculis horum subsistat, aut in mesenterio adfixus permaneat. Est autem acrimonia eiusmodi vel acida, quæ inprimis neruis est inimicissima, vel salsa, vel acido-biliofa. Viscositas vero tam pituitæ debetur, quæ hinc vel acida, vel salsa, vel pontica, vel vitrea, & glacialis, &c. euadit; quam a tartaro prouenit, qui itidem salia diuersimode retinet, concentrat & rebellia reddit, lymphamque ita deturpat, non raro tamen etiam & pituita & tartarus coniunctim crassitiem humoribus conciliant.

### §. IX.

Aliæ quoque res, præter naturam in intestinis, & mesenterio hærentes, obiectum tendens fiunt. In intestinis occurrunt scybala, coaceruata, & exsiccata, quæ non tantum flatibus præsentibus exitum præcludunt, sed



sed etiam humoribus, qui subsistentes, iamdum acres, adhuc acriores fiunt, vel, haud acres adfluentes, sola mora tales redduntur. Quodsi autem talis humorum status non sit, vt tantam salium quantitatem contineant, vt hæc euolui ita possint, effectus quoque talis haud sequitur, sed sola alui obstructio. Calculi quoque in intestinis quandoque generantur, qui, si tantum incrementum capiant, vt commode pergere contenta intestinorum nequeant, repletionem tanta facta, distensionem eorundem faciunt. Præterea iidem, si humores transeuntes iam acres sint, his adhærent, & dimissis particulis temperantibus, acriores fiunt, & ita obiectum tendens horum culpa nascitur, quod non minus contingit, si humores transeuntes nondum acres sint, salia tamen contineant, nam calculis adhærentes remanent, & sola mora salia euoluuntur, vt acres euadant. Vermes aliquando obiectum tendens fiunt, partim pungendo, morficando, rodendo; partim, si conglomerati plures sint, intestinum replent, distendunt, flatibus, fecibus, humoribus, obicem ponunt, vt hæc quoque talem conditionem adquirant. Deglutita duriora non resolubilia, vt nuclei ceraforum, acini & pelliculæ vuarum, vel similia, tam ob repletionem, & inde factam distensionem, quam ante dictis modis, talis causa euadunt. Minori quantitate autem solida deglutita, vt nummi aurei, aliquando obiectum tale constituunt, sed non tam per se, quam ob his adhærescentes humores, vel acres, vel tales euadentes.

#### §. X.

Inflammatiō intestinorum, & eorundem coalitus, vel post dysenteriam, vel alias, factus, rarius colicam, frequentius ileum infert. Reliqua, quæ huc referri possunt, sub



sub causis præternaturalibus continentur. In mesenterio obiectum tendens aliquando etiam est abscessus, ibidem latitans, & in eodem generatum pus acre redditum.

### §. XI.

Obiectum tale tendens vt fiat, faciunt causæ mediatae remotiores. Ex naturalibus temperamentum pituitosum, ob pituitam etiam secundum naturam abundantem huc pertinet, quæ facilius augmentum præternaturale recipit, & viscositatem reliquis quoque humoribus communicare valet & salium, acidorum inprimis, & falsorum, retentioni & augmentationi fauet. Biliosum temperamentum, & adhuc magis atrabilarium, acrimoniæ acido-biliosæ producendæ fauet; melancholicum autem tartareis, acidis, austeris, incrementum promptius suppeditat. In omni ætate occurrit, in prouectiori & declinante tamen, ob humores vappescentes, partesque balsamicas deficientes, facilius inuitari potest. Melior sexus, ob errores diætæ, sæpius fere ita corripitur, quam sequior, qui mensium beneficio liberatur facilius a dictis causis, ob vterum autem male habentem seorsim ita adficitur. Dispositio hereditaria etiam huic excludendo malo apta est.

### §. XII.

Ex causis nonnaturalibus aer calidior serum, nimis absumendo, fecum siccitatem promouere potest in siccioribus iam subiectis; euolutionem salium promouet, et, statim subsequa refrigeratione, salia fermentifica liberata retinentur, & hinc in dispositis paroxysmum excitare valet. Frigidus nimis aer pituitæ secretionem & excretionem impedit, salia fermentatiua exire non permittit, vnde, in corpore remanentia, hoc quoque malum



facile excitant; ventriculo, intestinis, & fibris nerveis, inimicus est, & hinc in talibus subiectis, vbi reliquæ causæ iam latitant, facile hunc morbum facit. Alimenta, nimia quantitate adsumta, cruditates tam viscidas lentas, quam acidas, acido-biliofas, & tartareas, inferunt; multo magis vero, si sint lenta, viscida, irresolubilia, & salibus fermentatiuis abundantia; adeoque in se iam fermentationem tum facile subeunt, tum, in corpore talibus humoribus scatente, promptissime excitant. Hinc pingua, vt caro veruecina, pisces, ostrearum abusus, carnes fumo induratae, vel aere exsiccatae, farinacea non fermentata, panis recens, placentæ, spiræ, nimis copiose commestæ, oua, ad duritiem cocta, castaneæ, lacticia, caseus, imprimis vetustus, leguminosa, flatulenta, pisa, lentes, fabæ, oleracea, acida, fructus horarii crudi, cerasa, imprimis cum nucleis deglutita, mespila, vuæ, cum pelliculis & acinis imprimis comestæ, & similia. Potus si sit impurus, fæculentus, acidus, vt cereuisia talis, mustum, vinum nouum, cereuisia triticea in minus adsueta. Potus frigidus, maxime adsumptis prius pinguibus, & alias cacochymia pituitosa vel acida præsentē, vt &, si calefactum prius corpus fuerit, & subito hauriatur, qua ratione etiam aquæ frigida, & niuis liquata, haustus noxius est. Ebrietas crebrior, cruditates acidas, tartareas, augendo, tum inuitat non raro colicam, tum, in impuris subiectis, & hac alias laborantibus, paroxysmum excitat.

### §. XIII.

Somnus nimius pituitæ augmentum, aliarumque partium crassarum, facit. Vigiliæ, modum excedentes, exsiccant, salium euolutionem & concentrationem, spirituum



rituumque imminutionem & debilitatem inferunt, vnde crassæ, lentæ, vna incrementum adquirunt. Motus nimius ferum minuit, salium fermentatiuorum euolutionem promouet, humores vitiosos, crassos, lentos, nimis commouendo, vnde nimis subito resoluuntur, exitum autem habere non valentes in multis paroxysmum colicum excludunt. Atque hoc eo promptius euenire solet, quando iam imminens alias est paroxysmus. Quies nimia vitæque sedentaria pituitæ & crassarum, tartarearum, & acidarum, partium secretionem & excretionem impedit, vti & viscido immerfa salia fermentatiua auctiora reddit.

#### §. XIV.

Adfectus animi vehementiores exagitant salia actiuiora fermentatiua, acido-biliofa, liberant, efferant, & fermentationem flatulentam excitant, vnde ira & ex-candescencia colicam excludere aliquando solent. Concentrantes vero animi adfectus, tum acidum & cruditates lentas, viscidas, tartareas, pituitosas, augent, tum spiritus & humores turbant, illosque debilitando, salibus fermentatiuis maiorem vim conciliant, morbosque tales generant, qui depurationem sanguinis debilitant & minuunt, vnde & hoc, & alia mala, postmodum excluduntur.

#### §. XV.

Excretiones feri blandi nimia viscidas, crassas, lentas, partes post se relinquunt, & salia quoque, vitiose retenta, concentrata & actiuiora inde fiunt. Non minus, si nec crassarum, lentarum, pituitosarum, tartarearum, nec salinarum acidarum, acido-biliosarum, falsarum, decens excretio per poros cutis, vrinam, & aluum, eueniat, ac-



cumulatio harum necessario fit, & hinc superius enarrata facile consequuntur. Alius itaque si non legitime aperta sit, fecesque diutius retineantur, malum nostrum facile in aprium prodit. Imo & flatus exituri si studio cohibeantur, sæpe produxerunt colicam, regurgitantes enim, & retenti, maiorem distensionem, & dolentem, inferunt, vt, spasmodica contractione inde inuitata, post modum excerni nequeant.

### §. XVI.

Ex præternaturalibus causis multas, in cauitate intestinorum hærentes, vt & in mesenterio inuentum aliquando abscessum, iam considerauimus. Adfectus hypochondriacus tam mineræ flatulentæ, quam acrimoniæ humorum irritanti, generandis maxime habilis est. In scorbuto, vel manifesto vel latitante, serum acre, tartareum, acidum, acido-biliosum, si vel in intestinis, vel in mesenterio decubitu adquirat, colicam excitat grauiorem sæpe, quam ab aliis causis ortam. Non minus in febre quartana, quæ acido tartareo debetur, & tertiana, quæ scorbutica haud raro est, miasma febrile, vel rebellius existens, vel, non recte per curationem tractatum, obiectum tendens, colicamque efficiens euadit. In adfectu hysterico si acidum biliosum irritans, cum vel sine flatulentia, intestina & mesenterium infestet, colica quoque nascitur. Imo in lue venera ab acido, pituitæ viscosiori immerso, interdum colica fuit obseruata. Icterus nonnunquam induxit colicam, balsamica bilis vi cessante, cruditatibus eiusmodi in intestinis ortis, vti & a calculis, in vesica fellea natis, fuit visa. Renum calculus, si per paroxysmum exitum adfectet, inter alia etiam colicam facit comitem; quæ etiam alias, a scorbuto fo-

ta,



ta, crebrius repetens, calculi renum productionem non raro post se trahit. Abscessus hepatis, vel lienis, vel renum, vel vesicæ, occasionem aliquando nostro malo præbuit. Huc etiam pertinent venena corrosiua adsumta, vt arsenicalia, potui aquoso vel alio, vel alimentis, mixta. Imo purgantia resinosa, minus solubilia & acriora, quæ intestinis adhærent, & stimulum continuum præstant, inprimis dispositione corporis tali præsentē, paroxysmum colicum excitarunt sæpe. Erosio intestinorum, qua hæc summe sensibilia redduntur, aliquando visa fuit, colicam grauissimam excitasse; ne de hernia, incarcerata inprimis, dicamus.

§. XVII.

Est autem colica vel legitima vel spuria. Illa est, quæ in intestinis, inprimis in colo, sedem habet; hæc autem, quando pars, vicina intestinorum, similibus doloribus, quales alias in colica fiunt, corripitur. Talis non raro est dolor mesenterii, satis grauiter adfligens & per longum tempus durans, & repetens, absque eo, vt intestina inde adficiantur, hinc mentitur sæpe colicam, nisi probe discernatur.

§. XVIII.

Legitima colica iterum vel a causa, in intestinis hærente & nata, ortum habet, & *essentialis* dicitur; vel causa hæc, in corporis alia parte orta, intestina adficit, & tunc *colica per consensum* est. Essentialis colica confurgit inprimis ab iis, quæ in cauitate intestinorum hærent, siue ab extra adsumta sint, siue alia, ibidem generata, id efficiant; deinde etiam eadem fit, si in substantia intestinorum, vel in eorundem superficie externa, obiectum tendens fabricetur.



## §. XIX.

In cauitate intestinorum causa si vna sit minera flatulenta, vel talem efficiat, fit *colica flatulenta*; siue acrimoniam non habeat coniunctam, vbi, nisi copiosa nimis quantitas flatuum generata sit, mitior est; siue eadem simul gaudeat, vbi, vt &, si nimius prouentus flatuum inclusorum adsit, grauior est colica. Quod si autem causa hæc mineram flatulentam nec constituat, nec faciat, sed, acrimonia tantum sua, fibras sensiles & mouentes tendat, fit *colica conuulsua*; qualis etiam emergit, si talis humor aeris in substantia intestini hæret, vel externæ eiusdem superficiei adglutinator est, vnde conuulsiui fiunt intestinorum motus & dolores, nulli autem flatus.

## §. XX.

Per consensum eueniens colica fit vel viscerum vel mesenterii culpa. Viscerum vitio fit, vel ob depurationem sanguinis læsam, vel ob alium morbum ibi hærentem. Ob depurationem sanguinis in malo hypochondriaco læsam oritur *colica hypochondriaca*; in scorbuto, *colica scorbutica*; in adfectu hysterico, *colica hysterica*; in lue venerea, *colica venerea*. Ob calculum, in renibus præsentem & in motum citatum, fit *colica nephritica*; ob abscessum in hoc vel illo viscere hærentem si fiat, peculiare nomen haud obtinuit. Mesenterii culpa si colica per consensum oriatur, vel ab abscessu ibidem hærente; vel ab humoribus acris, ibidem, viscerum dictorum vitio, decubitus facientibus; vel per nervos aliarum partium, v.g. renum adfectorum, mesenterii, ipsorumque intestinorum, nervis consentientes, vitiatos, id contingit. Atque talis colica semper est conuulsua.

## §. XXI.



## §. XXI.

Colica hypochondriaca, scorbutica, hysterica, venerea & nephritica, si humores, in his orti, ad intestinorum cauitatem perueniant, & simul mineram flatulentam constituent, etiam species flatulentæ colicæ euadunt, & tamen per consensum dictarum partium fiunt; quia in his, non autem in intestinis, nata est hæc minera. Sin autem in dictis partibus acris tantum, non flatulentus, humor productus, ad intestinorum vel cauitatem, vel substantiam, vel externam superficiem perferatur, omnes hæ species ad colicam conuulsiuam per consensum pertinent. Quod si vero in his recensitis partibus, humor acris irritans, non tam ad intestina, quam ad neruos mesenterii, qui fibris nerueis motricibus reuehentibus intestinorum continui sunt, perferatur, colica conuulsua intestinorum, per horum consensum, itidem excitatur.

## §. XXII.

Gradus doloris diuersimode quoque variat, vt sit vel remissior, quando causa tendens leuior est; grauior, si hæc vehementius agat; vehementissimus, si summa fibrarum neruearum fiat tensio. Grauiatius euadit, si vel flatus pauciores sint, & quodammodo tantum distendunt, vel pituita, quæ non ita acris est, tensionem remissiore, molestam tamen præstat; distensiuus a flatibus magis est; rodens, pungens, contundens, terebrans ab acido, pituitæ viscidæ immerso, magis vel minus acri, prouenit, & hic fixus magis est, in vno loco hærens, vt vagus a flatibus, quandoque & a crispatura spasmodica vaga, dependet; pulsans fit, si sanguis stasin aliquam vel leuiorem, vel inflammatoriam, concipiat.

Lanci.



Lancinans, lacerans, contorquens dolor in conuulsiva colica occurrit, vbi & aliquando pulsans simul infertur. Locus doloris diuersus, differentiam præbens, ex situ intestini, & loci eiusdem adfecti, patescit.

### §. XXIII.

Ab humorum conditione, vel mineram flatulentam constituentium, vel alias acrimonia sua obiectum tendens euadentium, colica etiam distingui solet, vt hinc dicatur vel pituitosa, quæ pituitam eminentiorem pro causa habet, cum acido diuersimode coniuncto; vel biliosa, quando acido-biliosus humor, sanguinem simul efferans, subest; vel flatulenta, de qua iam dictum est; vel stercoraria, vt quidam eam vocant, si fecum culpa eueniat; vel tartarea, quæ cum hypochondriaca, scorbutica, &c. coincidit. Durationis intuitu colica est vel breuis, vel chronica, vel continua, vel per paroxysmos adfligens. Maligna etiam aliquando, rarius tamen, obseruata fuit.

### §. XXIV.

Manifestat colicam præcipue dolor in abdomine, molestiam creans satis vehementem, in ea regione, vbi intestinum colon situm est, siue totum ita laboret, siue pars eiusdem, & hæc quidem vel circa initium, vel circa medium, vel circa finem, quod sedes & ambitus doloris ostendit. Si autem tenuia intestina dolorem sustineant, horum quoque regio, ab ægro ostensa, id prodit. Et hinc dolor, vel in hypochondriis, vel lumbis, vel in regione vmbilicali, apparens, id notat. Est autem dolor vel fixus magis, terebrans & torquens in vno loco; vel vagus, modo hunc, modo alium, intestini locum occupans. Intestina autem adfecta esse, minus  
vero



vero in vicinis partibus hærere dolorem, circumstantiæ coniunctæ docent. In ventriculi enim dolore situs huius statim innuit, qui superior est, inferiorem enim colicus habet. Hepatis dolorem in hypochondrio dextro præsentem, ne pro colico habeamus, remissior eius gradus ostendit, grauatiuus enim, non autem vehemens est, vt colicus; vti nec lienis dolor, qui in hypochondrio sinistro percipitur, pro colico haberi potest, cum itidem grauatiuus & longe remissior sit, vterque constantem locum seruat, qui in colico haud raro mutatur. Mesenterii dolor grauissimus est, non cedens remediis, in colica proficuis, & rebellis, per plures sæpe annos permanens vel repetens, obseruatur. Nephritis a colica discernitur per constantem magis, circa renis locum hærentem, dolorem, haud raro iuxta ductum vreteris descendentem, stuporem femoris huius lateris, arenularum excretionem, olim iam a calculo adfectum renem, & quæ alia se exerunt calculi præsentis indicia. Negari tamen non potest, vtrumque malum non raro simul se exerere. Ita etiam peritonæi & musculorum abdominis dolor cum colica confundi haud facile potest, si attendamus, hunc dolorem superficiei externæ abdominis viciniorem esse, colicum autem paulo profundior.

#### §. XXV.

Causam colicæ præsentem vt inueniamus, huiusque differentias deprehendamus, tam ad doloris conditionem, & symptomata reliqua, quam prægressas causas manifestas, respicere debemus, vbi, ratiocinatione recte instituta, ex his cognitis non ita difficile ferimur in eius notitiam. Flatus si adsint, ex dolore distendente, locum quandoque mutante, inflatione,

C

borbo-



borborygmis, murmuribus, imo ipsis flatibus, *αἶμα & ἰσχυρὰ* exeuntibus, vrina, bullas copiosas constantes in superficie exhibente, prægressis adsumptis fæculentis, fermentantibus, cibis pinguibus non resolubilibus, refrigeratione, & similibus, deprehenduntur. Si acres vna sint flatus, dolor vehementior est, & morficans, & pungens. Minera flatulenta si præter flatulentiam, quam præstat, acrimoniam fixiorem vna contineat, itidem rodendo, morficando, simul dolorem magis auget, quem flatus soli alias inferunt.

### §. XXVI.

In ipso intestinorum canali nata sit minera flatulenta, an aliunde accesserit, ex his discitur: si nullus in reliquis hæreat partibus morbus, qui talem efficere & ad intestina deriuare valet mineram, prægressi autem fuerint errores diætæ, qui talibus cruditatibus fabricandis apti sunt, ventriculique debilitas iam adfuerit, & præterea causæ adsint, flatuum exitum impediennes, vt fæcum copia, siccitas, &c. essentialis magis erit colica hæc flatulenta, sin autem mali hypochondriaci, vel scorbuti, vel adfectus hysterici, vel luis veneræ signa adsint simul, ex his ortum habere mineram hanc, concludere par est, adeoque per consensum tunc fieri.

### §. XXVII.

Minera flatulenta, si vel nullam acrimoniam, vel acidam tantum superfluam contineat, sine calore præternaturali æger permanet; sin autem acido-biliofa, magis vel minus vna tartarea, sit eadem, calor febrilis, pulsus celer, anxietas, sitis, oris amaror, vigiliæ, dolorque acutior, &c. se exerunt, quæ id patefaciunt. Pituæ vitreæ immersum acidum ponticum si sit, hæcque  
intesti-



intestino adhærescat firmitus, terebrante dolore fixo se manifestat.

§. XXVIII.

Humores nec flatulentia, nec abundantia, in intestinis peccantes, sed sola acrimonia & viscositate, si obiectum tendens constituent, siue in cauitate intestinorum, siue in eorundem substantia, siue in externa superficie subsistant, cum colicam conuulsuam producant, ex dolore lacerante, contorquente & lancinante, contorsione intestinorum dolorosa, contractione abdominis, crurum aliquando, aliarumque partium, sine flatuum indiciis, deprehenduntur. Acido-biliofi, magis vel minus tartarei, si hi humores quoque sint, itidem ex ardore vel calore magis vel minus intenso, pulsu celeri &c. intelligi id potest, ut ex caloris absentia acidi, vel falsi, cognoscuntur. His omnibus causas prægressas manifestas si addamus, magis id patescit.

§. XXIX.

Tales humores, si in ipsis nascantur intestinis, ex quacunque causa, essentialem etiam colicam conuulsuam faciunt; sin autem ob adfectum hypochondriacum, vel ob scorbutum, vel ob adfectum hystericum, vel luem veneream, vel ob calculum in renibus, vel ob abscessum visceris cuiusdam, generentur, & ad intestina perferantur, per consensum horum conuulsuam colicam fieri, ab eorundem præsentia manifestatur. Par ratio est, si vel indicia abscessus mesenterii, vel humorum eiusmodi, a morbis ante dictis productorum, decubitus in mesenterium facti, adsint, vel nervos aliarum partium adfectarum, ita læsos, mesenterii nervos per consensum adfecisse, cognitum euadat. Reliqua in in-



testinis hærentia, obiectum tendens euadentia, ex eorundem ordinariis signis, si habeant, erui debent, reliqua vero, vt abscessus in mesenterio latitans, a posteriori ferre tantum patefcunt, nisi prægressa manifesta quædam ad coniecturam artificiosam sufficientia data exhibeant.

§. XXX.

Euentus colicæ plerumque salutaris est, interdum tamen, vehementioribus doloribus persistentibus sine remissione, in vno loco magis permanentibus, vigiliis continuantibus, aluo non succedente, vel, si aperiatur nullum leuamen adferente, vomitu repetente & vrgente, singultu, lipothymia, sudoribus frigidis, extremorum refrigeratione, & similibus accedentibus, periculum vitæ fit. Hæc autem eueniunt, si minera flatulenta sit rebellior, impetuosior, vt nec corrigi, nec educi sufficienter queat. Hoc vero contingit vel ob morbum rebellio-rem alium, mineram producentem & fouentem, vel si via exeuntibus flatibus, & mineræ, contumacius oclusa sit, ob scybala nimis exsiccata & impacta, ob vermes conglomeratos, ob calculos maiores ibi hærentes, ob solida deglutita copiosiora, ob inflammationem, ob co-actum, ob herniam incarceratam, ob contractionem spasmodicam, nimis diu continuantem &c.

§. XXXI.

Non minus hæc consequuntur, si humores non flatulenti, sed nimis acres & visceri, rebelliores & contumaciores euaserint, & colicam conuulsuam grauiorem produxerint, nimis adhærescant intestinis, in cauitate interna, in substantia intestinorum, in eorundem superficie externa; si conseruentur & foueantur ab aliis morbis grauioribus, inprimis scorbuto, abscessu in vicinia lati-

tante



tante &c. Talia etiam apparent, si mesenterium primam labem sustineat, & in intestinis per huius consensum, siue in se ipso contineat talem morbum, siue aliunde itidem adfectum sit, colicam conuulsuam grauiorem excitet.

§. XXXII.

Leuior causa, imprimis externa tantum, si produxerit colicam, hæc non ita diu durare solet. Neque a vehementiori causa facta, grauissima & periculosa symptomata coniuncta habens, longam moram permittit. Chronica euadit potissimum scorbutica, quæ per paroxysmos cruciat ægros, ut & a similibus causis fota, pro quarum conditione vel breuius, vel tardius cursum suum absoluit.

§. XXXIII.

Finiri solet colica perfecte vel per discussionem, vel per excretionem manifestam, flatuum & fæcum, sudoris, aliquando etiam urinæ copiosioris. Flatulenta colica in icterum etiam abit, sed transitorium, quia flatus, tantum per breue tempus, bilis exitum ad intestina prohibuit. Eadem contumacior in tympanitidem quandoque transit. Ileus etiam nonnunquam colicæ succedere solet, alui obstructionem grauiorem si coniunctam habeat, tum alias, tum ob inflammationem, vel coalitum, intestini præsentem. Quandoque paralysis excipit colicam, quæ paresis dici consuevit. Tartareis magis partibus abundantibus, si decubitus in articulos fit, arthritis colicam sequitur. In renibus si id fiat, calculus quoque oritur. Acidum spiritus figens, eminentius euadens, post colicam melancholiam, & si acido-biliosum sit, epilepsiam, interdum producit. Mors vero a



colica fit vel resolutione & destructione spirituum, sub symptomatibus superius enarratis, vel a morbo lethali, v.g. ileo, succedente.

#### §. XXXIV.

Curatio colicæ vt fiat, necesse est, vt distensio fibrarum neruearum adfectarum spasmodica tollatur. Hoc vt obtineatur, primo obiectum tendens corrigendum & remouendum est; deinde fibræ neruæ intestinorum, hinc & mesenterii, demulcendæ & roborandæ sunt; & tandem spirituum motus vitiosus temperari & in ordinem redigi debet.

#### §. XXXV.

Obiectum tendens, si sint flatus, hi præsentès minuendi sunt, eorumque productio præcauenda est. Præsentès flatus minuunt tum, quæ mineræ flatulentæ fermentationem sistunt, tum, quæ eosdem, & mineram ipsorum, euacuant. Fermentationem hanc sistunt, quæ motum salium fermentatiuorum sedant. Præstant hoc sale volatili oleoso pollentia: rad. zedoar. galang. carlin. pimpin. alb. angel. imperator. gentian. rubr. essent. pimpin. alb. zedoar. cal. arom. galang. cort. aurant. castor. essent. carmin. Wed. spiritus carmin. Sylu. spir. sal. ammon. anifat. fassaf. essent. & decoct. hormini, decoct. flor. chamom. Rom. & simpl. aqua carminat. aromata omnia, spec. diacymin. diaspol. Galen. arom. caryoph. rosat. diagalang. dianif. elect. de bacc. laur. diacori, theriac. Androm. Sistunt hanc fermentationem salina acida subtilia, magis resoluentia, vt spir. nitri simplex & dulc. clyssus antimonii; alcalica: essent. antim. tartar. simpl. & compos. vel per se, vel oleis destillatis roborata; media: arcan. tartari, arcan. duplic. tartarus vi-

triolatus,



triolatus, nitrum antimoniatum, nitr. depurat. flores salis ammon. quibus tam cinnabarina, quam absorbentia, commode adduntur. Eidem enim scopo conuenientia etiam sunt absorbentia, tam alcalina terrea lap. cancror. conch. corall. mater perlar. ipsæque calces antimoniatæ, quam sulphurea : flores sulphuris, cinnabarina, succinata, aurum fulminans, ipsæque opiata, refractæ reliquis addita.

### §. XXXVI.

Fermentationem hanc sistunt, flatus discutunt, & fibras nerueas demulcent & roborant, externa, vt sacculi paregorici ex rad. zedoar. galang. angel. imperat. ireos Flor. cyper. rot. cal. arom. herb. menth. abroton. serpill. absinth. puleg. flor. chamom. R. & simpl. summit. aneth. absinth. bacc. laur. sem. anis. petroselin. caru. anethi, sem. lini, sal. commun. furfuribus & similibus; olea externa ex ol. hyosc. anethino, chamomill. rutac. castorin. ol. destill. anis. foenic. caru. menth. iuniper. succin. alb. rutæ, ol. petr. alb.; vnguenta ex vnguent. neruino, martiato, additis ol. destillat. modo dictis; balsama ex ol. nucist. expresso, iisdem oleis destill. adiectis; emplastra: de crusta panis, carmin. Syluii, de bacc. lauri; cataplasma ex fermento & aceto, additis aromatibus; calida actu reddita varia, vt lapides serpentine, sacculi ex milio, vel auena, vel nucleis cerasorum, opercula ollarum &c.

### §. XXXVII.

Flatus eorumque mineram euacuant commode clysteres lenientes & carminatiui, qui insigne emolumentum præstant. Euacuant lenientia, vt elix. proprietat. salia media, nitrosa, sal Sedlizense, pilulæ tartareæ



reæ lenientes *Wedelii*, & aliorum, rhabarbarum cum salibus mediis.

### §. XXXVIII.

Productionem flatuum præcauent, quæ faciunt, ne minera flatulenta generetur. Hæc autem cum humoribus crassis, lentis, tenacibus, pituitosis tartareis, & salia fermentatiua continentibus debeatur, hi corrigendi & eliminandi sunt. Corrigunt tales humores, quæ viscidas lentas partes resoluunt, saliaque ibidem immersa liberant, & temperant. Præstant hoc, si per errores diætæ tantum in primis viis collectæ & generatæ fuerint tales cruditates, eadem, quæ flatus præsentis minuunt. Nam præcauent talem mineram, quia agunt viscidum resoluendo, salia liberando, & corrigendo, & postmodum euacuando. Vbi id tantum attendendum est, vt ea seligantur, quæ speciali acrimoniæ corrigendæ apta magis sunt, quod & in ipsis flatibus minuendis obseruandum venit. Calidiora enim & aromatica, si acrimonia biliosa, vel acido-biliosa, in his humoribus simul emineat, omittenda, vel parcius miscenda sunt. Magis autem tunc conueniunt salina media, nitrosa, acidula, absorbentia, & resoluentia terrea & sulphurea, vt cinnabarina, quæ in omni statu conueniunt, & vniuersalia magis sunt. Mitiora quoque redduntur carminatiua, si salina media ipsis combinentur, & nitrosa. Correcti vero ita humores, extra paroxysmum, eliminantur quoque per purgantia, magis resolubilia, minus autem resinosa, vnde senna, rhabarbarum, species diasennæ, spec. diagalappæ, quibus etiam pro re nata mercurius dulcis addi poterit.

### §. XXXIX.

Quodsi autem minera flatulenta ab adfectu hypochondria-



chondriaco, vel a scorbuto, vel ab adfectu hyfterico, vel a lue venerea foueatur, extra paroxysmum aperientia, his malis debita, quibus & iungi, & interponi ex iam dictis apta queunt, adhibenda erunt, quæ specialem illam viscositatem & crassitiem resoluunt, & acrimoniam coniunctam corrigunt. Correctione sufficiente ita obtenta, euacuatio quoque apta instituenda est, vt eliminetur. Calculus renum si talem mineram habeat iunctam, eiusdem curatione hæc simul tollitur.

## §. XL.

Febres intermittentes, male curatæ, si huic minera ansam dederint, salia media cum febrifugis, & aperientibus, euacuantibus rite interpositis, officium faciunt. Vermes si in culpa sint, anthelmintica, salia media, vna cum carminatiuis, vtilia sunt, purgantibusque mercurius dulcis optime tunc additur. Fæces induratas salia media cum cinnabari natua & absorbentibus, minori quantitate iunctis, facilius emolliunt, non omittis humectantibus, lenientibus & clysteribus. Eadem salia media, ita vsurpata, in calculo intestinorum, si huius suspicio sit, vtilia sunt. Inflammatio intestinorum, vt & hernia incarcerata, si in causa sint, horum curatio ex suis loculis administranda est.

## §. XLI.

Humores acres & visci, non flatulenti, si obiectum tendens constituent, & colicam conuulsivam efficiant, itidem corrigendi & remouendi sunt; siue in ipsis intestinis hæreant, & vel ibidem generentur, vel viscerum depurantium culpa orti, in adfectu hypochondriaco, scorbuto &c. aut ab alio horum morbo producti, in eadem proueniant; siue in mesenterio hæreant,



aut ibi nati, aut ob viscerum vitium illuc depositi; siue aliarum partium nervos, cum mesenterio & intestinis consentientes, adficient.

§. XLII.

In intestinis hærens eiusmodi humor acidus, falsus, pituitosus, crassus, existens corrigitur incidentibus & resoluentibus, & acrimoniam acidam temperantibus. Incident & resoluunt sale volatili oleoso gaudentia, non tamen nimis calida; salina alcalica, salina media §. 35. recensita; resoluit etiam pituitam viscidam gummi ammoniacum, in potionibus rite adhibitum. Viscerum culpa si nata sit talis pituita viscida acida, extra paroxysmum aperientia, & alia, morbo horum præsenticongrua, in usum vocanda sunt.

§. XLIII.

Acrimoniam acidam temperant tam eadem laudata resoluentia, alcalica vna existentia, vt & salina media, quam absorbentia & præcipitantia, dietis iuncta & interposita. Opiata autem hic non conueniunt.

§. XLIV.

Remouent hunc humorem, & vna temperant clysteres blandi, ex emollientibus, resoluentibus & lenientibus in principio, paulo actiuioribus in progressu. Fortiores enim tunc non adhibendi sunt, cum irritationem magis præstent, quam decentem euacuationem. Lenientia etiam profunt & purgantia, minus autem fortiora, in paroxysmo inprimis. Correctione autem viscidi sufficienter facta, actiuiora etiam aliquando sunt necessaria, magis tamen extra paroxysmum. Vtiliter purgantibus mercurius dulcis tunc additur, vt etiam pilulæ de gummatibus Syluii aptæ hoc loco sunt.

§. XLV.



§. XLV.

In hac etiam causa corrigenda, vtilia reperiuntur externa §. 36. proposita. Resoluunt enim, acrimoniam temperant, & nervos demulcent & roborant.

§. XLVII.

Acido-biliosus autem si sit hic humor, magis vel minus simul tartareus, calorem efferans, corrigitur per nitrosa, salia media alia, spiritum nitri dulcem, absorbentia, tam laudata, quam bezoardica, vt & crySTALLUM montanam. Opiata etiam, hic congrua sunt, & refracte reliquis mixta, & alias rite adhibita, vt diascord. Frac. ad ʒij in holo. Diluentia etiam vsum insignem præstant, vt decoct. hord. cum C. C. & scorz. ▽ scorz. ceras. nigr. &c. in potionibus & alias. Frigidæ quoque potus a quibusdam commendatur, immo etiam multa niue, refrigeratæ. Non autem temere imitanda hæc sunt, nisi omnes circumstantiæ, prudenter examinatæ, aliquando id concedant. Egelida enim, ante commendata, liquida idem præstant, quod a frigida aqua sperari potest, emolumentum, hæc autem male cedere non raro potest; tutior igitur via eligenda est.

§. XLVII.

Eundem humorem temperant & remouent clysteres blandi, &, eductione facta, magis mitigantes acrimoniam, ex lacte solo cum saccharo, sero lactis, vt & ex emollientibus & paregoricis parati. Corrigunt & remouent lenientia interna, vt oleum amygdal. dulc. rec. cum iusculo sumptum, manna, vt & sal Sedlizense ad ʒij. in aqua feruida solutum, & propinatum, aluo adstricta existente. Corrigunt & remouent diaphoretica & bezoardica blanda, tinctura bezoard. mixtura



simplex, eff. pimpin. alb. scordii, antimon. diaph. cinnab. natiu. &c. Corrigunt quoque externa, superius laudata, abdomini imposita.

§. XLVIII.

Sin autem & hic humor ab adfectu hypochondriaco, vel scorbutico calido, vel adfectu hysterico foueatur, superato paroxysmo, horum malorum curatione per aperientia & euacuantia, huius conditionem simul emendantia, corrigi debet, & præcaueri, ne de nouo generetur.

§. XLIX.

Ab alio viscerum morbo si proueniat talis humor acris, vt abscessu eorundem, hoc vitium ex suo fonte emendari debet; calculus, in renibus præsens, si in causa sit, ad hunc curatio simul dirigenda est.

§. L.

In mesenterio decumbens humor talis acris si faciat malum, & ab abscessu eiusdem fiat, huic, quantum fieri potest, succurri debet. Viscerum autem vitium si ortum huic præbeat, eodem modo, vt ante dictum, procedendum, & malum fouens eradicandum, est. Alius partis adfectæ nervi, si mesenterii & intestinorum nervos per consensum adficiant, præsens illius partis morbus ex suo fonte remouendus est, ita enim, huius nervis liberatis, consentientes quoque nervi nullam molestiam amplius subeunt, sed sibi redduntur.

§. LI.

Fibræ nervæ intestinorum & mesenterii demulcentur & roborantur iisdem recensitis remediis, internis & externis, inprimis nervinis temperationibus, &c. pro causæ specialis conditione, adiuuanti- bus, cinnabarinis, succinatis, sale volatili oleoso pollentibus, emollientibus &c. Nec minus spirituum motus vitiosus iisdem temperatur, & in ordinem redigitur.

§. LII.

Aer temperate calidus maxime in hoc morbo obseruari debet, frigidus enim summe noxius est. Alimenta vitari debent lenta, viscida, fermentatiua, acrida, & reliqua, sub causis recensita, ea autem seligenda, quæ causæ præsentis corrigendæ vna apta sunt. Potus frigidus nocet, calidus leuamen adfert, purus tamen sit, defæcatus, & causæ fouenti proportionatus. Somnus decens utilis est, vigiliæ alienæ sunt continuatæ. Quies in paroxysmo prodest, motus extra paroxysmum blandus, & decenter institutus, confert. Animi motus excedentes omnes abesse, & præcaueri, debent. Alius aperta seruetur, & reliquæ excretion- nes rite se habeant.

SOLI DEO GLORIA!



SIMONIS PAVLI HILSCHERI  
MEDICINAE DOCTORIS THEORET. PROFESS. PVBLIC.  
ORDINARIII

SERENISSIMIQUE DVCIS SAXONIS GOTHANI ET  
ALTENBVRGENSIS A CONSILIIIS AVLICIS

H. T.

FACVLTATIS MEDICAE DECANI

---

PROLYSIO I.

DE

AQVA VITALI  
CORDIALI MICROCOSMICA

---

PVBLICAE INVITATIONI

AD

*DISSERTATIONEM INAVGVRALEM*

DE

COLICA

D. XXVI. SEPTEMBRIS HABENDAM

PRAEMISSA.

---

IENAE D. XX. SEPTEMBRIS M DCC XXXIX.

---

LITTERIS CROEKERIANIS.









uantam curam quantamque industriam  
artis salutaris cultores in inveniendis  
hominum sanitati labefactatæ restitu-  
endæ congruis remediis ab omni fe-  
re ævo versarint, atque pro hoc  
obtinando fine nihil non reliquerint  
tentatum, aliquando felici, ali-  
quando minus tali successu, verbis exprimi vix potest.

Aliquod hujus rei, ut speramus, suppeditabit testi-  
monium *aqua vitalis cordialis microcosmica*, eximio quon-  
dam nostri Athenæi Professori Medico B. GVERNERO  
ROLFINCIO dicta, *Chimie Lib. III. sect. I. art. I. c. 7.* qui  
eam præparandi modum ibidem his tradit verbis: Est ea-  
dem halitus hominis jejuni atque sani (qui quibusdam  
audit mumia hominis sani, i. e. sulphur humanum) ma-  
ne ore bene aqua mundato in phialam vitream fortiter &  
diu inspirando immissus & propter ἀντισπέριασιν frigoris  
in aquam solutus. Allegat etiam celeberrimus vir, quod  
ab iis, qui halituum censent magnam esse efficaciam, sum-  
mum habeatur in morbis incurabilibus confortativum, si  
id fiat bona intentione, corde puro, precibusque devotis.  
Hanc tamen subiungit ἐπίκλησιον: Sed non videtur operæ  
pretium & laudes & fundamenta a quibusdam in medium  
allata & a se ibidem recensita ad commendationem hujus  
medicamenti magni æstimare.

Liberalius vero de huius aquae viribus sentit incly-  
tus quondam Professor Medicus Lipsiensis, B. IOANNES  
MICHAELIS, in notationibus ad laudati Rolfincii Chymiam,



& quidem ad indicatum locum, vbi illam in affectibus pulmonum valde prodesse scribit, simul tamen probe præcipit, ut homo e cujus halitu præparatur, bene valeat, cum alias per halitum quis in phthisin vel alium gravem morbum facile incidere possit. Duo etiam cum hac aqua feliciter facta experimenta laudat, quae ut ipsiusmet verbis consignata recenseamus, valde utile nobis videtur.

Nobilis sponsus, scribit, animi anxietatibus variis turbatus, cum febrilis invasionis periculo, multis præfidiis sublevabatur, meo jussu aquam hanc ad cochlear semis, porrigebat sponsa, illibata pudicitiae virgo, e vestigio melius habebat. Alterum experimentum ita se habet:

Nobilis virgo ex mensium suppressione palpitacione & syncope per intervalla laborabat, accedebat febris ardens, & jam omnia erant desperata, vultu incipiebat matrem referre, nostro consilio N. aquam suam microcosmicam exhibuit & bene cessit.

Nostri nunc officii rationem exposcere procul dubio judicabit benevolus Lector, ut: an aqua hæc tuto, porro an cum spe juvaminis, ac demum si profit, a quibusnam causis salutaris sit derivandus effectus? exponamus.

Tuto eadem propinari poterit, si, quod duo laudati egregii auctores bene præceperunt, eadem colligatur ex halitu hominis in optimo sanitatis flore constituti, jejuni oreque prius aqua mundato, ne ulla halitui tetra immixta sint effluvia.

Enim vero ut hujus aquæ indolem genuinam quis rite capere queat, monere æquum est, esse eandem istam portionem materiae transpirationis, sive vaporem istum, qui e particulis aquosis seu serosis, hisque immerfis atomis salinis ac sulphureis constat, & in pulmonum, tracheæ & faucium confitis glandulis continuo secernitur & per earum poros excretorios exit, & cum aëre permixtus expiratur, affatimque collectus in guttas demum & aquam  
ali-



aliquam, artificio dicto, condensari potest. An vero hæc aqua, ministerio pneymatolabii, in tanta copia fuerit præparata, vt curiosi ex ea crystallos, saliaque & sulphur conficere potuerint, ut prodiderunt FABRICIVS BARTHOLETVS *Lib. V. de diffic. Respir.* & BARTHOLINVS *de substantia & motu pulmon.* Sect. II. hos auctores in hunc finem allegante *illustri ac celeberrimo BERGERO Physiol. Med. L. I. c. IX.* definire non audemus. Licet id fieri posse utique concedamus, si sufficiens hujus liquoris adfit copia.

Nobis aquam microcosmicam dictam hominis sanissimi tuto dari posse asserentibus, mox quosdam contradicentes audimus, prætendentes, id ideo fieri non posse, cum eadem e vapore corporis humani excrementitio condensetur, qui tanquam inutilis extra limites corporis nostri ejiciatur. Verum nullo modo omnes humores, non amplius alimentarii, e corporibus sanissimis excreti, & in alia corpora in modica quantitate deriuati mox noxii iudicandi sunt, sed habent iidem aliquando non contemnendam vim medicam, vel unius urinæ e perfecte valentibus pueris desumptæ exemplo, quæ a jejunis mane emissæ suavem & violaceum quasi spargit odorem, variisque in affectibus, plebejis præsertim hominibus, in usum salutarem cedit: licet alias nulla excrementa humana sibi relicta a medico eleganti commendari vel exhiberi debere statuamus, nisi extra ordinem quasi in casibus plane singularibus.

Quid etiam mali in se continere queat halitus optime se habentium puerorum, puellarum, adolescentum, juvenumve non videmus, cum eorum Ma Sea sulphure puro balsamico, a salibus non nihil expanso, gaudeat. Cadit igitur suspicio de noxa aquæ microcosmicæ cordialis, e sanissimis desumptæ hominibus. Alia vero utique res est, si aqua hæc suam debeat originem corporibus, sive morbis acutis, sive etiam chronicis quibusdam laborantibus:



horum enim halitus impuris ac noxiis effluviis inquinati sunt, & ideo in corpora etiam sana translati, multo magis vero in ægrota, iisdem varii generis labem affricare solent, per consequens ex ejusmodi halitibus parata aqua microcosmica admodum noxia & insalubris existit, & angue canequæ pejus est vitanda.

Denique ut aqua hæc rite parata aliquando tuto propinari queat, requiritur maxime, ut a persona subiecto ægrotanti grata defumatur, nec ipsi obtrudatur invito: secus enim si fieret, facile in spiritibus irregulares motus concitare morbumque augere posset.

Restarent duo circa aquam nostram discutienda momenta, sicut supra monuimus: sed scopus, cujus causa hanc prolusionem fecimus, injungit nobis, ut ulteriorem de eadem disputationem in proxime futuram differamus occasionem, & nunc

Candidati nostri clarissimi & dignissimi

## TOBIAE GODOFREDI STRELINI

huc usque laudabiliter factum vitæ & studiorum cursum more recepto exponamus, & ad ipsius Dissertationem inauguralem O. O. Auditores decenter invitemus.

Natus est Oettingæ d. XVII. Junii MDCC XVII. Patre beatæ nunc memoriae, Viro maxime reverendo, Dn. GEORGIO FRIDERICO STRELINO, Illustrissimi Comitæ Oettinga-Oettingensis & Oettinga Wallerstei-  
nensis, dum viveret, a consiliis rerum Ecclesiasticarum, nec non Diœceseos Trochtelfingensis Antistite speciali atque Pastore meritissimo; Matre MARIA ELISABETHA, matrona sexus sui virtutibus ornatissima, beate defuncti IOHANNIS FRIDERICI KOBELT, Serenissimi quondam Principis Oettingensis B. M. Camerae Consilarii & Præfecti filia.

Omnem



Omnem curam hi parentes dilectissimi eo intenderunt, ut in primis Christianae nostrae religionis fundamenta probe caperet, aliisque imbueretur pro ratione ætatis utilibus ac necessariis.

Ætate paulo provectior Seminarii quod Oettingae floret, præceptorum curæ atque informationi traditus tum linguæ Latinæ tum Græcæ posuit fundamenta, aliaque ad humaniora spectantia tractavit, ubi præsertim virorum præclarissimorum atque doctissimorum, DN. GEORGII FRIDERICI BRECHENMACHERI, Seminarii Oettingensis Rectoris & Inspectoris, Amitini sui maxime colendi, & DN. IOHANNIS PREV, ejusdem jam laudati Seminarii Con-Rectoris meritissimi informationibus fidelissimis multa se debere affirmat. Aptus sic reditus ut ad altiora progredi posset, Anno M DCC XXXVI d. IX Aprilis patria relicta florentissimam hanc Musarum Jenensium sedem adiit, ac fide obsequioque promissis a Pro-Rectore t. t. Magnifico, b. DN. D. SYRBIO, Professore Theologo celeberrimo, in civium academicorum numerum est receptus.

Artis salutaris studium cum sibi maxime placeret, Collegia adeundi medica, scopo apta, mens erat, præmissa hinc *Logica*, quam manucentibus Viris t. t. clarissimis b. Dn. Professore KOEHLERO, atque itidem b. Dn. D. HERZOGIO audivit, sequentia ad medicinam præcipue spectantia Collegia frequentavit.

Illustris nempe & Excellentissimi Consilarii Aulici & Professoris, DN. GEORGII ERHARDI HAMBERGERI, ductu *Physicam, Cursum Mathematicum, Physiologiam, Pathologiam, Materiam Medicam, Semioticen, Methodum medendi & præscribendi formulas atque Chirurgiam* audivit.

Præeunte Viro Illustri atque Excellentissimo, Dn. Consiliario Aulico & Professore, HERMANNO FRIDERICO TEICHMEYERO, jam hujus Prytanei tenente



nente fascēs, *Anatomiam*, *Osteologiam*, *Botanicen*, *Chymiam* & *Materiam Medicam* addidicit, ejusdemque *sectionibus cadaverum*, sexu atque ætate diuersorum, dexterrima manu factis, *demonstrationibusque anatomicis* interfuit, quotiescunque hæ instituerentur.

Ex ore etiam Viri illustris & Excellentissimi Dn. Consiliar. Aulic. & Professoris IOHANNIS ADOLPHI WEDELII, Facultat. Med. & totius Academiae Senioris venerabilis, *Praxin* audivit solidissime propositam, nec non ejusdem sui Præceptoris, quem omni mentis pietate colit, *Collegium Chymicum* publice prælectum huc usque frequentavit maximi cum fructus perceptione.

Tandem e meis prælectionibus publicis, quas in *Semiologiam* celeberr. Boerhavii habui, se commodum hausisse affirmat.

Maturatis igitur probe studiis nomen suum mense Julio a. c. apud Facultatem nostram professus numero Candidatorum adscriptus fuit, atque in examinibus confuetis omnibus Facultatis nostræ membris se ita probavit, vt ipsi lubentissime licentiam concederent publice defendendi suam dissertationem inauguralem de COLICA sub Præsidio Viri illustris & venerabilis Dn. Consiliarii Aulici & Senioris laudati WEDELII, D. XXVI. Septembris. Huic panegyri vt Magnus Academiae Pro-Rector, illustrissimi Comites, venerandi Academiae Patres, honoratissimi Hospites & præsertim generosi & nobilissimi Commilitones gratiosam & benevolam præsentiam concedere dignentur, perofficiose & peramanter oro atque contendo.

P. P. sub Sigillo Facultatis Jenæ M DCC XXXVIII.

A. D. xx. Septembris.

(L.S.)



E P I S T O L A

---

DE

METHODO PRAECAVENDI  
IN CONSOLIDANDIS  
VULNERIBUS ET VULNERIBUS  
CICATRICEM

---

Q V A

*VIRO NOBILISSIMO ATQUE DOCTISSIMO*  
TOBIAE GOTHOF.  
STRELINO

AMICO AETATEM SVSPICIENDO  
IMPETRANDOS

IN

ARTE MEDICA HONORES

GRATVLANTEM ANIMVM

PERAMANTER DECLARAT

HENRICVS IOHANNES  
MEIBOMIVS

HELMSTADIENSIS

PHILOS. ET MED. CVLT.



IENAE, LITTERIS CROEKERIANIS.



8 11 2 19 3

IN

METHEUN'S GREAT

THE

WINTERBURY'S

CLAYTON'S

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE





VIR NOBILISSIME ATQVE DOCTISSIME  
AMICE SVAVISSIME.



Sanctiora, quae inter nos continentur amicitiae iura me transgredi vimque modestiae TVAE inferre omnino arbitrarer, quodsi eruditionis TVAE ornamenta, quibus prae aliis exsplendescis, multis licet iustissimis laudibus insignire conarer. Lubens enim profiteor, me nec quidquam claritatis esse nomini TVO doctissimo hoc officiorum meorum genere adlaturum, neminemque fore, quem eximiis animi TVI dotibus, in quibus tribuendis naturam fautricem habuisti, non in TVI gratiam atque amorem mire adlexeris. Insigni horum numero ego imprimis adscribor, quem a primo die aduentus mei apud Musas Salanas suavisissima consuetudine TVA, ex qua commoda fere singularia in me redundarunt, demeruisse mihi gratulor. Qua ex re desiderio iam dudum exoptatae occasionis teneor, TIBI animum humanitatis TVAE erga me memorem pa-



lam declarandi. Cuius lux hodierna ex voto me participem reddit, qua nempe praestantissima splendidissimaque studiorum praemia TVORVM, egregii artis apollineae honores, in TE conferuntur. Eo maiori laetitia partes de dignitate consecuta gratulantis TIBI, AMICE AESTVMATISSIME, praesto; quo minus nulla alia feliciori ratione TIBI pro singulari TVA in me voluntate, quae sese in eruditis mecum factis sermonibus maxime ostendit, rependere possim. Ex his certissimam semper coniecturam politissimi ingenii TVI & illius aestimationis feci, cuius fructus hodie percipis vberrimos. Non aequitatem offendere videor TVAM, AMICE DVL-CISSIME, quodsi prolixius testimonium de rebus medicis, quas familiarissimis verbis mecum communicasti, in medium proferam. Recentissima fortasse memoria supremum argumentum pensitabis, quod pro virium nostrarum conditione temporisque usu de Medicinae, praesertim Chirurgiae gloria ex ignorantia Chirurgorum quorundam obscurata in colloquium vocauimus. Haec inscitia, qua Chirurghi incredibiliter laborant & non leues Arti Medicae notas inurunt, iam in tempora antiqua misere prorupit & quendam *Poetam* ita dolendam illorum temeritatem viuis coloribus depingere impulit:

*Fingit se Medicum quiuis idiota, sacerdos,  
Iudaeus, monachus, histrio, rasor, anus.*

In tollendis istis erroribus perniciosissimis & scientiae sanandi praestantissimae remediis adhibendis, ne in ignominiam & detrimentum illius cedant ulterius,



terius, cura nostra semper est versata. En! AMICE DOCTISSIME, potiores causas, quae, ne lateat laboris nostri momentum, ad consignandam cogitationum nostrarum summam mentem meam quam maxime impulerunt. Vitiorum copia omnino inaudita opprimerer, longiusque iusto hisce delineandis immorarer, si omnes ex Chirurgorum culpa in Medicinam demanatos errores memoriae prodere vellem. Quapropter necesse duxi inter tot tantosque vnicum tantum ratione lustrare, quem in consolidandis vulneribus & ulceribus omni die concipere haud erubescunt. Non enim de partis solutae recta sanatione satis solliciti medicamentis tam internis quam externis vtuntur nulla habita exquisita ratione illorum, quae & ad partis dissolutae conditionem & ad naturam vitii in aegro perscrutandam pertinent. Qua ex re ita iniqua succedit consolidatio, vt relicta cicatrix, licet sanitati humanae semper non obsit, tamen si parti videndae est obducta, illi non parum deformitatis conciliet. Ne hicce Chirurgorum error ex turpi imperitia natus diutius admittatur, sed in meliorem abeat partem, rectam medicamentorum ad consolidandas partes dissolutas necessariorum adplicationem, hincque *Methodum praecauendi in consolidandis vulneribus & ulceribus cicatricem*, quantum harum angustiae pagellarum concedunt, pro virili exponam.



## §. I.

**C**icatrix est concretio parietum vasculorum, quacunque a causa dissolutorum iamque iunctorum, vel inter se vel cum fluido in illis stagnante.

## §. II.

Hinc evidens est: cur in parte ita adfecta (§. 1.) difficilis & parca transpiratio? cur illa soliditate, duritie, insensibilitate & candore alias partes superet? & denique cur in ea tempestatis ratio nonnunquam, dolorem excitet?

## §. III.

Concretionem talem (§. 1.) efficit aequilibrium in parte soluta sublatum inter vasculorum resistantiam & vim liquidorum influentium, ita vt vel vasculorum resistantia superet vim fluidorum vel haec illam.

## §. IV.

Causa igitur aequilibrui huius sublata (§. 3.) insita est vel 1) fluidis, vel 2) solidis.

## §. V.

Fluida hoc praestant (§. 4. n. 1.)

1) quantitate vel  $\alpha$ ) excedente, vel  $\beta$ ) deficiente potissimum a haemorrhagia immoderata orta;

2) qualitate  $\alpha$ ) ob visciditatem,  $\beta$ ) fluiditatem nimiam,  $\gamma$ ) acrimoniam vel salinam acidam, alcalinam & muriaticam, vel oleosam, vel putridam;

3) motu  $\alpha$ ) excedente ob quantitatem maiorem (n. 1. l.  $\alpha$ ), & acrimoniam quamcunque (n. 2. l.  $\gamma$ ) fibras cordis irritantem,  $\beta$ ) deficiente ob quantitatis vel excessum vel defectum (n. 1.), visciditatem (n. 2. l.  $\alpha$ ), fluiditatem nimiam (n. 2. l.  $\beta$ ) & vasorum inertiam.

## §. VI.

Solida autem partium dissolutarum id faciunt (§. 4. n. 2.) vel 1) debilitate vel 2) robore maiori.

## §. VII.



§. VII.

Cognito iam quid aequilibrium in parte dissoluta inter vasculorum resistantiam & vim fluidorum influentium tollat (§. 4-6.), illius praesentia vel absentia, tum & quid illorum (§. 4-6.) hoc sustulerit, facile patebit recte consideranti conditionem partis solutae sensibus patentis, temperiem aegri, vitiique in illo naturam.

§. VIII.

Cum autem causa cicatricis in aequilibrii absentia (§. 3.) posita sit, facile in promptu erit, methodum praecauendi in consolidandis vulneribus & vlceribus cicatricem consistere in eo, ut cognita aequilibrii inter vasa & fluida vel praesentia vel absentia (§. 7.), illud 1) si adhuc praesens, conseruetur, vel 2) si absens, restituitur.

§. IX.

Primum (§. 8. n. 1.) quo perficiatur, requirit, ut feruentur 1) fluida  $\alpha$ ) tenuia, sed tamen  $\beta$ ) aliquantulum glutinosa,  $\gamma$ ) omni acrimonia destituta, &  $\delta$ ) aequabili motu praedita; 2) solida  $\alpha$ ) satis robusta,  $\beta$ ) flexibilia & dilatabilia.

§. X.

Quae (§. 9.) ut obtineantur, sequentes regulae quoad res non naturales probe seruande veniunt:

1) Aer sit serenus, ficcus, temperate calidus, ab exhalationibus putridis defaecatus, saepeque renouatus. Et ne etiam hicce aequilibrium tollat, summa ope a parte adfecta arceatur; quod fit, si illa  $\alpha$ ) linamentis carptis medicamentis balsamicis madidis probe tegatur; talia sunt balsamus peruianus, tolutanus, copayuae, oleum hyperici, liliorum alborum, therebinthinae, ouorum, essentia myrrhae, aloes, succini, aliaque;  $\beta$ ) his (1.  $\alpha$ ) imponatur Emplastrum nil nisi tenacitate sua retentionem illorum praestans; reiecta hinc inutili illa farragine, qua



qua Chirurgi quidam multum efficere sibi falso persuadent, Emplastrum sufficiat ex cera & oleo quodam vulnerario factum.

2) Victus sit simplicissimus, liquidis sanis simillimus, aut illis facile assimilandus per vires nostras coctrices, facultate nutriendi abundans, omni acrimonia destitutus, nec facile putrescens, parca copia sed saepius adsumtus. Cibus ideo optimus petitur ex iusculis carnis bonae notae, lacte, fructibus suauibus, acido-dulcibus, succulentis, perfecte maturis cum aqua coctis, oleribus blandis, lacteis, vitando omnia acria, facile putrescentia, tum & illa, quae difficulter in chylum mutantur. Potui autem inseruiunt decocta farinosa vt hordei, auenae, tritici, emulsiones ex iisdem factae, decocta panis dilutiora & quandoque cereuisia tenuis. Maxime tamen quid cuilibet profit vel noceat, elucescit, si prius aegri temperies & vitae genus notescat.

3) In motu ac quiete semper iusta obseruetur mensura, praepremis tamen haec illi praeferenda erit.

4) Vigiliae vitentur, hinc cessante somno conciliandus anodynus lenissimis vt Emulsione ex amygdalis dulcibus, seminibus 4 frigidis maioribus, semine papaueris albi cum aqua florum tiliae, papaueris albi, papaueris rhoeados facta, colaturae addendo syrupum papaueris albi vel diacodii, vel si haec non sufficiat, diascordio Fracastorii in bolo, aut theriaca coelesti in potione aut opio ipso in puluere sed parca dosi exhibitis.

5) Excretiones ordinariae semper procurentur, maxime aluus quotidie seruetur laxa victu emollienti (n. 2.), & hoc non satis efficaci, vsu decocti tamarindorum, cassiae, mannae, colaturae addendo syrupum rosarum solutiuum aut cichorei cum rheo, vel pilularum ex extracto panchymagogo Crollii, vel salis  
sedli-



sedlicensis; tum etiam ope clysterum emollientium & suppositoriorum.

6) Animo semper concilietur hilaritas, hinc alienae sint animi agitationes vehementiores, vt ira, terror, tristitia, cura, meditationes, & amor insanus.

§. XI.

Secundum vt fiat (§. 8. n. 2.), vitia fluidorum & solidorum aequilibrium tollentia ( 4 - 6. ) remouenda erunt.

§. XII.

Quantitas igitur fluidorum (§. 5. n. 1.) 1), si excedat, minuenda erit per venae sectionem pro ratione abundantiae sufficientem; 2) si deficiat, restauranda venit copiam requisitam humoris sani restituentibus, quae petenda maxime ex victu (§. 10. n. 2.) memorato.

§. XIII.

Visciditas humorum (§. 5. n. 2. l. a) si aequilibrium tollat, corrigitur diluentibus & resoluentibus. Diluunt aquea praesertim calida, infusa cum primis & decocta herbae thee, radicum 5 aperientium maiorum, radicis graminis, cichorei, sarsaparillae, bardanae, herba veronicae, trifolii fibrini, rutae, agrimoniae, betonicae, absynthii, saponariae, beccabungae, summitatum centaurii minoris, ligni sassafras, feminis dauci, apii, aliorumque.

Resoluunt 1) salina vel acida, tartari cremor & crystalli, sal acetosellae, vel alcalica fixa, sal absynthii, cardui benedicti, centaurii minoris, vel media, nitrum, sal gemmae, sal ammoniacum, tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum aut in pulueribus exhibita aut decoctis addita; 2) saponacea, sapo hispanicus aut venetus, mel, manna, cassia, oxymel, succi absterfui recentes plantarum blande amararum, essentiae & extracta amara variis formis adhibita; 3) decocta vegetabilium iam recensitorum.



Quorum delectus optime fit cognito acri singulari viscido iuncto.

#### § XIV.

Fluiditas humorum nimia si in culpa sit (§. 5. n. 2. l. β), emendatur inspissantibus.

Talia sunt 1) gelatinosa & farinosa ex victu (§. 10. n. 2.) commendato desumenda;

2) oleosa vt amygdalae dulces, pistachiae, nuclei armeniacorum, persicorum, semen papaveris albi vel forma emulsionis vel olei expressi adhibita;

3) absorbentia, lapides cancerorum, conchae, mater perlarum, corallia aut emulsiōi addita aut in puluere data;

4) mucilaginosā, vt decocta ex radice symphyti, scorzonerae, polypodii, glycyrrhizae, herba maluae, altheae, verbasci, floribus maluae, altheae, verbasci, caricis pinguibus, passulis, dactylis, jujubis, sebesten, colaturae addendo syrupum dialtheae Fernelii, vel liquiritiae, vel de symphyto.

#### § XV.

Acrimonia humorum vitium inducens (§. 5. n. 2. l. γ) in genere requirit diluentia & obtundentia, quo maxime spectat victus (§. 10. n. 2.) recensitus, tum & oleosa (§. 14. n. 2.) & mucilaginosā (§. 14. n. 4.) nec non anodyna (§. 10. n. 4.) tacta.

#### § XVI.

Acrimonia igitur acida aequilibrium tollens (§. 5. n. 2. l. γ) exigit correctionem

1) acrimoniae generatim obuenientibus (§. 15);

2) absorbentibus (§. 14. n. 3.) tactis;

3) salibus alcalicis fixis (§. 13. n. 1.) nominatis;

4) decoctis vel infusis vegetabilium antacidorum magna ex parte (§. 13.) iam memoratorum, tum & radicis armoraciae, helenii, aristolochiae longae & rotundae,



dae, galangae, zedoariae, herba polii montani, nasturtii, erysimi, cardui benedicti, semine sinapi, aliorumque.

§. XVII.

Acrimoniam autem alcalinam (§. 5. n. 2. l. γ.) emendant

- 1) quae acrimoniam in genere corrigunt (§. 15.);
- 2) salina acida & media ad acidum adcedentia ex adductis (§. 13. n. 1.) eligenda, quo & faciunt spiritus acidi dulces, nitri, salis, vitrioli;
- 3) saponacea leniter acescentia (§. 13. n. 2.) tacta.
- 4) decocta, radicis oxylapathi, acetosellae, herbae acetosae & acetosellae.
- 5) succi vegetabilium acidi tam natiui, citri, auran-  
tiorum, quam fermentati, vinum rhenanum, mosella-  
num, decoctis commixti.

§. XVIII.

Acrimonia muriatica si vitium sit (§. 5. n. 2. l. γ.) singularia non exigit, sed iis, quae acrimoniae in genere occurrunt (§. 15.), optime corrigitur.

§. XIX.

Acrimonia oleosa aequilibrium destruens (§. 5. n. 2. l. γ.) petit quidem correctionem generalibus acrimoniae remediis (§. 15.), sed cum pertinacius vasis adhaeret & non facile diluentibus auscultat, desiderat adhuc

- 1) lenissime acida, vt decocta tamarindorum, ceraforum nigrorum, aliorumque fructuum acido-dulcium, nec non salia acida & media acido proxima (§. 13. n. 1.) nominata;
- 2) abstergentia saponacea leniter acescentia (§. 13. n. 2.) data.

§. XX.

Acrimonia putrida si vitium inducat (§. 5. n. 2. l. γ.),



remediis acrimoniam oleosam emendantibus (§. 19.)  
quam maxime auscultat.

### §. XXI.

Motus humorum si excedat (§. 5. n. 3. l. α), sedatur

- 1) imminutione quantitatis nimiae (§. 12.);
- 2) correctione acrimoniae cuiuscunque fibras irritantis (§. 15-20.);
- 3) anodynis (§. 10. n. 2.) vel interpositis vel refractis aliis additis;

### §. XXII.

Motus humorum deficiens (§. 5. n. 3. l. β) excitatur

- 1) ablatione quantitatis nimiae (§. 12. n. 1.);
- 2) restitutione quantitaris deficientis (§. 12. n. 2.);
- 3) correctione visciditatis (§. 13.) & fluiditatis nimiae (§. 14.);

4) roborando vasa decoctis vegetabilium modice adstringentium, radicis tormentillae, bistortae, herba faniculae, alchymillae, pentaphylli, pimpinellae, telephii vulgaris, vincae pervincae, sophiae Chirurgorum, floribus granatorum, tamarisci, semine lapathi, bardanae, tum & (§. 17. n. 4. iam tactorum;

5) Stimulando fibras motrices per decocta vel infusa ex radice imperatoriae, vincetoxici, zedoariae, herba chamaedryos, chamaepityos, floribus lauendulae, anthos, cardamomo, cortice cinnamomi, semine anisi, foeniculi.

### §. XXIII.

Debilitas solidorum partis solutae (§. 6. n. 1.) emendatur fibrarum robur restituendo.

Restituunt 1) quae fibras corrugant ac constringunt, quo pertinent interne decocta vegetabilium (§. 22. n. 4.), externe autem spiritus vini, tincturae cum eodem ex herbis  
vul-



vulnerariis factae & balsamica subadstringentia (§. 10. n. 1. l. α) recensita.

2) quae humidum in interstitiis fibrarum nimis copiosum auferunt; talia sunt interna fluiditatem humorum nimiam corrigentia (§. 14.) & externa humidum absorbentia, pompholyx, tutia, lapis calaminaris, cerussa, alumen leviter calcinatum, aliaque;

#### §. XXIV.

Robur nimium solidorum in parte dissoluta (§. 6. n. 2.) minuitur fibras relaxando.

Relaxant 1) mucilaginosae & oleosae, quo faciunt interne decocta (§. 14. n. 4.) memorata & externe balsamica oleosae ex tactis (§. 10. n. 1. l. α) desumenda;

2) quae humidum in interstitiis fibrarum deficiens restitunt; spectat huc aqua ad teporem sani corporis calida interne sumta & externe adplicata.

#### §. XXV.

Quo autem optime horum medicamentorum usus ad vitia emendanda (§. 11 - 24.) succedat, diaeta non negligenda erit, quae cuique vitio conueniens ordinanda nullam difficultatem parit consideranti regulas (§. 10.) datas.

#### §. XXVI.

Conseruato sic aequilibrio inter vasorum resistetiam & vim liquidorum influentium praesente (§. 9. & 10.) & restituto absente (§. 11 - 25.) efficitur,

1) vt succus nutritius ad partem laesam delatus in extremis poris adhaereat, ibique subsistat, sicque fibrarum molem ita augeat, vsque dum harum duae extremitates oppositae & separatae denuo sese contingant & ex hoc contactu cohaereant; hincque

2) vascula quacunque a vi dissoluta per modum anastomoseos vniantur, eorumque fines per impetum liquidi



extendantur, vt non solum transpirationi, sed etiam sudori pateſcant; ſicque

3 ) praecaveatur concretio parietum vaſculorum diſſolutorum tam inter ſe, quam cum fluido, & conſequenter cicatrix.

**N**e autem in tanta materiei vbertate diutius perpendenda fortasſe patientia TVA abuti & modum in ſcribendo tenendum excedere plane videar; habeas illa velim, AMICE SVSPICIENDE! quae contemplatione privata proſequi e re noſtra iudicauimus. Neceſſitas quidem efflagitaſſet, media, quibus res peregrinae vel mortuae inter partes ſeparatas interpoſitae ſint ſubtollendae, harumque depuratio ſit ingredienda, oſtendendi. Aſt, quo temporis breuitati conſulam & rationi inſtituti mei ex parte ſatisfaciam, depurationem iam factam ſuppono, modumque depurandi tanquam notiſſimum praetergredior, rogoque, vt his mecum adquieſcas. Non dubito autem, quin publicis nunc litteris permiſſam tractationem methodi praecauendi in conſolidandis vulneribus & vlceribus cicatricem eo gratiori vultu accipias; quo maiori emendationi errorum Chirurgis futuram eſſe quam certisſime ſperamus. Nec nobis deerit comprobatio illorum, qui de tam pernicioſis vitiis exſtirpandis cogitantes felicitati humanae ex integritate corporis ſeruanda fluenti, mirum in modum inſeruiunt. Et quaeso in quae vtiliora & ad vitae noſtrae finem adcommo-datiora incumbere nos, qui Medicinam amplectimur,



mur, potuissimus? Subductis hisce rationibus iure prae ceteris nobiliori nos obstrictos fuisse arbitror, operam in illis rebus locare nostram, quae quam maxime ad nos respicientes dignae omnino fuerunt, ut in lucem proferrentur. Quid plura? perceptio gaudii, quod ex ornatu frontis TVAE insigni nunc haurio, tanta abundat suauitate, quantam non verbis complecti possum. Respondeat igitur desideratissima TVA praesentia expectationi Patriae votisque aegrotantium de TE factis auxiliorum TVORVM copia, prout diligentiam in Arte Medica satis a TE feliciter positam eruditorum opinioni satisfecisse laetissimis abhinc auribus percipient. Quo breviori temporis spatio conspectu Parentum TVORVM amantissimo caruisti, viribusque mentis TVAE laudabili exemplo omnia tam celeriter arripuisti, quam usus aliorum felicissimo adcommodaisti; eo ardentiori TVI videndi desiderio flagrare illos praeclare opinor. Et quae mora hoc Atheneo illustri TIBI est facienda? Ex eius dulcissimis fontibus tantos sapientiae profectus hausisti; quantos cum munere dignitatis clarissimae TIBI oblato iam adaequare potuerunt. Inter tot tantaque eruditionis specimina mihi proclive foret, ut ostenderem, dissertationem TVAM de Colica agentem principem merito locum obtinere. Verum enimvero satius esse arbitror, silentio hanc praetergredi considerato, ne perspicacitatis meae exiguitate quidquam illi laudis detrahatur, latiusque fines litterarum mearum iam transiti extendantur.



Faxit DEVS T. O. M. vt per longam annorum seriem inuidenda fruaris felicitate, quae cum salute omnium, qui aduersa laborantes valetudine periculis vitae erepti a TE sunt, mire conspirat. Valeas incolumis floreasque sospes ad familiae TVAE gaudium atque solamen, quod ipsi ex nominis TVI gloria ac corporis integritate in dies firmitus insigniusque exoritur. Quod reliquum est, maximo TE opere rogo, ne amicitiae nostrae vinculum dissoluatur, illud memoria gratisfima, meque amore antiquo complecti porro perbenevole velis. Ego omni cura atque studio illa officiorum genera TIBI tribuam, ex quibus me TIBI non amicum modo, verum etiam aestimabis amicissimum. Vale.

Dabam Athenis Salanis d. xxvi. Sept.

clb Io cc xxxix.

